

Andrzej Kokoszka, Marta Laskowska, Joanna Mikuła

Сравнение локализации чувства контроля лиц с маячением и без маячения, а также анализ чувств в маячении 9-19

Содержание

Задание. Сравнение локализации контроля (внешний и внутренний) в группах: зависимых, госпитализированных по поводу неосложненного алкогольного синдрома абстиненции (СА) и синдрома абстиненции, осложненного маячением (СМ), а также анализ содержания психотических переживаний пациентов с СМ.

Методы. Группа 255 пациентов, леченных по поводу неосложненного синдрома СА и 25 пациентов, леченных по поводу СМ в Отделении лечения алкогольных синдромов абстиненции.

Очередные пациенты, госпитализированные с СМ и СА заполнили Глоссарий I-E Локализации контроля Роттера, Полимерную шкалу локализации контроля здоровья, Инвентарь и шкалу психопатологических симптомов, а также Карту мира бреда.

Результаты. В ходе анализа отмечено существенно статистически ($p = 0,036$) значимое, более внешнее расположение чувства контроля, измеренного шкалой I-E, в группе лиц с СМ, чем в группе лиц с СА без маячения ($M = 13,28$ – откл. $2,762$, и $M = 11,64$, откл. $2,612$, $t_{(48)} = 2,157$, $p = 0,036$). Группа больных с СА обладала результатом, указывающим на существенно низшее чувство внутреннего контроля в шкале ($M = 24,8$ откл. $6,149$ и $M = 26,6$, откл. $4,648$, $t_{(48)} = 1,93$, $p = 0,04$). В группе пациентов с СА больше лиц пережило присутствие слуховых галлюцинаций (84%) и зрительных (80%). Чаще всего появлялись бредовые симптомы отношения (92%) и преследования (80%). У почти половины больных симптомы маячения влияли на поведение.

Выводы. Более внешняя локализация чувства контроля может быть одним из факторов риска развития синдрома маячения. Содержание психических переживаний влияют на поведение многих больных с симптомом маячения.