

Andrzej Kokoszka, Marta Laskowska, Joanna Mikuła

Les expériences psychotiques au cours de symptômes d'abstinence alcoolique : comparaison de la localisation du sentiment de contrôle des personnes avec le délire et sans le délire ainsi que l'analyse des expériences subjectives du délire 9-19

Résumé

Objectif. Comparer la localisation du sentiment de contrôle (intérieur vs extérieur) des deux groupes d'alcooliques hospitalisés à cause du syndrome d'abstinence alcoolique avec le délire et avec ce syndrome sans le délire et analyser les expériences psychotiques de ces patients.

Méthodes. On examine 25 patients avec le délire et 25 sans le délire hospitalisés à cause des symptômes d'abstinence alcoolique.

Ces patients sont examinés avec les questionnaires suivants : Internal-External (I-E) Locus of Control Scale by Rotter, Multidimensional Health Locus of Control Scale (MHLC), Psychopathological Symptoms Inventory by Bizon.

Résultats. Dans le groupe de patients avec le délire on constate que la localisation du sentiment de contrôle est plus extérieure ($p=0,036$) d'après échelle I-E, que dans le groupe de patients sans le délire ($M=13,28$; $SD=2,762$ versus $M=11,64$; $SD=2,612$; $t_{(48)}=-2,157$; $p=0,036$). Ce groupe de patients avec le délire a aussi le sentiment de contrôle interne plus abaissé – d'après l'échelle MHCL ($M=24,8$; $SD=6,149$ versus $M=26,8$; $SD=4,648$; $t_{(48)}=1,99$; $p=0,04$). Dans ce groupe aussi 84% ont des hallucinations auditives et 80% des hallucinations visuelles, 92% ont des hallucinations concernant les événements et 80% – concernant des persécutions. Les expériences psychotiques influent sur le comportement de presque 50% de patients.

Conclusions. La localisation plus extérieure du sentiment de contrôle peut être un des facteurs du risque du développement du délire. Le contenu psychotique des expériences vécues influe sur le comportement des patients avec le délire.