

Anna Potoczek

Связь защитных механизмов людей с утяжелением симптомов комплекса параксизмального страха и депрессии у женщин и мужчин с тяжелой и трудной, а также аспириновой астмой 21-33

#### Содержание

**Задание.** Проведение психиатрического исследования двух групп больных, страдающих астмой: 106 пациентов с астмой тяжелой и трудной, а также 100 пациентов с аспириновой астмой с различными степенями тяжести. Задачей исследования была проверка различий в применении защитных механизмов личности женщинами и мужчинами в обеих исследованных группах, а также их связи с утяжелением симптомов комплекса параксизмального страха и депрессии.

**Метод.** 106 взрослых пациентов с, диагностированной специалистами пульмонологами, астмы тяжелой и трудной и 100 пациентов с аспириновой астмой обследованы психиатром с использованием также Глоссария МИНИ 5,00. Глоссария депрессии Бека, Шкалы паники и агорафобии (ПАС) и Глоссария защитных механизмов (ДСКу40). Психиатрическое исследование было проведено психиатром с учетом диагностических критериев ИЦД-10 и ДСМ-IV. В исследовании приняло участие 78 (74%) женщин и 28 (26%) мужчин с тяжелой и трудной астмой, 66 женщин (66%) и 34 мужчины (34%) с аспириновой астмой. В группе с астмой трудной и тяжелой средний возраст женщин равнялся 51,3 года (откл. 14,5 г.), а для мужчин 47,5 г. (откл. 12,7 г.). В группе больных аспириновой астмой 52,7 г. (откл. 12,3 г. для женщин и 48,8 г.) откл. 13,30 г.) для мужчин.

**Результаты.** В ходе исследований обнаружено, что во всей группе с астмой тяжелой и трудной пациенты значительно чаще использовали невротические и незрелые защитные механизмы, нежели пациенты с аспириновой астмой. В обеих группах астматических больных большинство составляли женщины (74% в группе с астмой тяжелой и трудной и 66% в группе с аспириновой астмой). В обеих группах у женщин и мужчин отмечено сильную тенденцию к снижению частоты применения сознательных механизмов и одновременного роста использования невротических и незрелых механизмов по мере утяжеления тяжести симптомов параксизмального страха и депрессивных симптомов.

**Выводы.** По-видимому, качество применяемых защитных механизмов личности связано с созданием феномена астмы тяжелой трудной появляющейся в популяции астматических больных, особенно у женщин.